

隽清®



羧甲司坦口服溶液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用


【药品名称】

通用名称: 羧甲司坦口服溶液
英文名称: Carbocysteine Oral Solution
汉语拼音: Suojiasitan Koufurongye

【成份】

本品每10毫升含羧甲司坦0.5克。辅料: 羧甲基纤维素钠、三氯蔗糖、羟苯甲酯钠、焦糖色、甜橙香精、氢氧化钠、纯化水。

化学名称: S-(羧甲基)半胱氨酸
化学结构式:



分子式: C₅H₉NO₄S
分子量: 179.19

【性状】

本品为棕黄色至浅棕色的粘稠液体; 气香。

【作用类别】

本品为祛痰类非处方药品。

【适应症】

用于治疗慢性支气管炎等疾病引起的痰液粘稠、咳痰困难患者。

【规格】

10毫升: 0.5克

【用法用量】

口服, 成人一次10毫升, 一日3次。

【不良反应】

- 胃肠道疾病, 如胃部不适、胃痛、恶心、呕吐、腹泻、胃或肠出血。
- 过敏性皮疹和过敏反应, 如荨麻疹、瘙痒、皮肤斑疹或丘疹、血管性水肿。
- 固定性色素性红斑。
- 大疱性皮肤病, 如多形性红斑、史蒂文斯-约翰逊综合征。
- 轻度头痛。

【禁忌】

- 对本品的活性成份或任何其它成份(特别是羟苯甲酯钠)过敏者禁用。
- 消化道溃疡活动期患者禁用。

【注意事项】

1. 用药7日后, 如症状未缓解, 应立即就医。
2. 有消化道溃疡史者慎用。
3. 儿童应在医师指导下用药。
4. 孕妇、哺乳期妇女, 老年人慎用。
5. 对本品过敏者禁用, 过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 请勿与强镇咳药或减少支气管粘液分泌的药物(如阿托品)同时使用。请勿与其他与本品活性成份(如羧甲司坦)相同的产品合并用药, 以免超过推荐剂量。如正在使用其他药品, 使用本品前请咨询医师或药师。
9. 本品不得随餐服用。
10. 如采用无糖或低糖饮食, 亦可使用本品。
11. 本品含羟苯甲酯钠, 可能引起过敏反应(反应可能延迟)。
12. 本品含钠。每15ml溶液含有96.9mg钠。严格钠饮食的患者慎用。

【药物相互作用】

1. 应避免同时服用强镇咳药, 以免痰液堵塞气道。
2. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用, 详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

本品为粘液调节剂, 主要作用于支气管腺体的分泌, 使低粘度的唾液粘蛋白分泌增加, 高粘度的岩藻粘蛋白产生减少, 因而使痰液的粘稠性降低而易于咳出。

【贮藏】

遮光, 密封, 阴凉(不超过20°C)保存。

【包装】

聚酯/铝/聚酯/聚乙烯口服液体药用复合膜。10毫升/袋, 6袋/盒, 10袋/盒, 15袋/盒。

【有效期】

24个月。

【执行标准】

国家药品监督管理局药品注册标准YBH08702023

【批准文号】

国药准字H20234113

【说明书修订日期】

2024年01月29日

【药品上市许可持有人】

企业名称: 北京康祯生物科技有限公司
注册地址: 北京市顺义区北台路北石槽段6号院1号楼3层301室
邮政编码: 101301
电话号码: 010-60422673

【生产企业】

企业名称: 北京诚济制药股份有限公司
生产地址: 北京市顺义区中北工业区(北石槽镇)
邮政编码: 101301
电话号码: 010-62991779
传真号码: 010-53934516

BC004A01

如有问题可与药品上市许可持有人或生产企业联系

